



Դրա մասին լսելը
հեշտ չէր, սակայն
ուրախ եմ, որ արագ
բուժվեցի:

Քլամիդիայի
մասին իմացիր
ավելին՝

- Չանգեք անվճար
1-800-232-4636
- Կամ այցելեք
www.ashastd.org

Քլամիդիա՝ Ինչ պետք է անելք հիմա

Սեռական զուգընկերոջ քլամիդիայով է վարակվել:

Սա բուժելի վարակ է, որը մարդ կարող է ստանալ սեռական ճանապարհով: Հնարավոր է դուք էլ վարակվեք քլամիդիայով:

Չուզընկերոջ քլամիդիայի դեմ դեղ է ընդունել: Դուք էլ պետք է բժշկի տեսնելք ու սեռային ճանապարհով փոխանցվող վարակների (ՍԾՓՎ) ստուգում անցնելք, և խորհուրդ է տրվում, որ քլամիդիայի բուժման համար հնարավորինս շուտ դեղորայք ընդունելք:

Ահա թե ինչ պետք է իմանաք՝

- Քլամիդիան հեշտությամբ է բուժվում: Սակայն թե դուք և թե ձեր զուգընկեր(ներ)ը պետք է հնարավորինս շուտ նշվածի համաձայն ընդունելք դեղորայքը:
- Քլամիդիայով կարող եք վարակվել առնանդամով, հեշտոցով կամ անալային սեռական հարաբերությունից: Դրանով կարող եք վարակվել նաև օրալային սեքսից (առնանդամից, հեշտոցից, կամ հետանցքից բերան):
- Շատերը քլամիդիայով վարակված են և տեղյակ չեն:
- Ոմանք ցավոտ միզարձակում ունեն, հեշտոցից, առնանդամից, կամ հետանցքից անսովոր արտադրություն, հետանցքից արյունահոսում կամ կոնքի ցավ:
- Բուժման չդիմելը կարող է ձեր մոտ լուրջ խնդիրներ առաջացնել, նույնիսկ անպտղություն:
- Եթե բուժման չդիմեք, հետագայում հղիանալու դեպքում քլամիդիան կարող է երեխայի մոտ լուրջ բարդություններ զարգացնել:

Չուզընկերոջ տված դեղահաբերը ընդունելք:

Ջեր զուգընկերը կարող է դեղ կամ դեղատոմս բերել որ ընդունելք: Ամեն դեպքում կարևոր է, որ ինչպես նշված է հնարավորինս շուտ ընդունելք դրանք:



Ահա թե ինչպես ընդունել դեղերը՝

Doxycycline (100 մգ): Յոթ օր, ամեն առավոտ և գիշեր ընդունեք մեկ դեղահաբ: Եթե ստամոքսը խանգարվի, կարող եք սննդի կամ ջրի հետ ընդունել: Doxycycline-ը խմելուց հետո 30 րոպե ուղիղ (ստամոքս կամ կանգնած) մնացեք:

ԿԱՍ Azithromycin (1 գրամ): Հենց որ ստանաք ամբողջը մեկ անգամից ընդունեք:

- Այս հաբերը ուրիշին Մի՛ Տվեք:
- Ձեր դեղերը պետք է որևէ հակաթմբկային դեղ (TUMS), կալցիումի հավելում կամ լուծողական դեղից 6 ժամ առաջ կամ հետո ընդունեք:
- Դեղերն ընդունելիս կարող եք հեշտությամբ արևայրուկ ունենալ, հատկապես doxycycline-ի դեպքում:

Մարդկանց մեծ մասի մոտ այս դեղահաբերից կողմնակի լուրջ ազդեցություններ չեն լինում:

- Ոմանք հնարավոր է գլխապտույտ ունենան կամ ստամոքսի խանգարում/լուծ:

Սրանք սովորական խնդիրներ են, որոնք մի քանի օրից անցնում են: Եթե չանցնեն, դիմեք բժշկի: Նաև ձեր բժշկի հետ խոսեք եթե քոր է առաջացել կամ հեշտոցից արտադրություն է լինում:

Հաբերը մարդկանց մեծ մասի համար շատ ապահով են:

Նախքան դեղորայքն ընդունելը խոսեք ձեր բժշկի հետ, եթե՝

- Երբևէ հակաբիոտիկից վատ ազդեցություն, ցան, կամ ալերգիա եք ունեցել:
- Լուրջ հիվանդություն ունեք, օրինակ՝ երիկամի, սրտի, կամ յարդի:

- Այս պահին դեղագրով այլ դեղ եք ընդունում:
- Հղի եք կամ հնարավոր է հղի լինեք:
- Կծրքով կերակրում եք:

Որքա՞ն ժամանակում է վարակն անցնում:

7 օր է տևում: Դեղն ընդունելուն հաջորդող շաբաթվա ընթացքում՝

- Լավ կլինի հեշտոցով, առնանդամով, բերանով, կամ հետանցքով սեռական հարաբերություն ընդհանրապես չունենալ:
- Եթե սեռական հարաբերություն ունենաք, պետք է պահպանակ կիրառեք, եթե ոչ նորից կարող եք քլամիդիայով վարակվել:

Անմիջապես գնացեք բժշկի, կլինիկա, կամ Շտապ Օգնություն եթե՝

- Փորի ցավ ունեք:
- Սեռական հարաբերության ժամանակ ցավ ունեք:
- Խզզոց/շնչելու դժվարություն ունեք:
- Փսխում եք:
- Ցան կամ ջերմություն ունեք:
- Ամորձիների ցավ ունեք կամ այտուցված են:

Սա կարող է նշանակել, որ ձեր մոտ վարակն ավելի սուր է և ավելի զորեղ դեղի կարիքն ունեք, կամ էլ հակաբիոտիկից ալերգիկ ռեակցիա ունեք:

Քլամիդիայի թեստ անցեք հիմա:

- Թեստը ցավոտ չէ՝ մեզի միջոցով է: Նաև կա անձամբ կատարվող քսուքի թեստ:
- Որևէ մեկը, ով վերջին 60 օրում սեռական հարաբերություն է ունեցել պետք է ստուգվի:
- Եթե դրական է եղել, 3 ամիս հետո կրկին ստուգվեք, հավաստիանալու, որ նորից քլամիդիայով չեք վարակվել:

Գտեք ձեզ ամենամոտ կլինիկան՝

- Ձեր գուգրնկերոջը հարցրեք որտեղ է ստուգվել, կամ գնագեք CDC թեժ գիծ 800-CDC-INFO կամ 800-232-4636:
- ՍՃՓՎ-ի այլ թեստեր էլ անցեք վստահ լինելու, որ սիֆիլիս կամ ՄԻԱՎ չունեք:
- PrEP -ի միջոցով ՄԻԱՎ-ից պաշտպանվեք, ամենօրյա հաբ, որն օգնում է ՄԻԱՎ-ից զերծ մնալ: