

سوزاک:

آنچه باید هم اکنون انجام دهید

هم خوابه شما به بیماری سوزاک مبتلا است.

این نوعی بیماری عفونی قابل درمان است و افراد از طریق داشتن رابطه جنسی به آن مبتلا می شوند. شما هم احتمال دارد سوزاک داشته باشید.

هم خوابه شما برای درمان سوزاک دارو مصرف کرده است. شما هم باید به یک پزشک مراجعه کنید و از نظر بیماریهای مقاربتی آزمایش شوید و برای درمان سوزاک در اسرع وقت دارو مصرف کنید.

آنچه لازم است بدانید:

- درمان سوزاک آسان است. هر دو شما و هم خوابه (یا هم خوابه های) شما باید در اسرع وقت، دارو را به نحوی که مشخص شده، مصرف کنید.
- شما می توانید با داشتن رابطه جنسی از طریق آلت تناسلی مردانه، واژن یا مقعد، سوزاک بگیرید. همچنین با داشتن رابطه جنسی از راه دهان هم می توانید به سوزاک مبتلا شوید (تماس دهان با آلت تناسلی مردانه، واژن یا مقعد).
- بسیاری از افراد سوزاک دارند و خودشان نمی دانند.
- برخی از افراد در زمان ادرار کردن سوزش دارند، از واژن، آلت تناسلی یا مقعد ترشح یا از مقعد خونریزی دارند یا درد لگن دارند
- در صورتی که درمان نشوید، ممکن است بشدت مریض پ شوید یا نتوانید بچه دار شوید
- کسانی که درمان نشوند و بعد باردار شوند، سوزاک می تواند به بچه ها صدمه بزند.

درمان شوید

هم خوابه شما می تواند برای شما دارو یا نسخه بیاورد. به هر صورت، آنچه اهمیت دارد این است که آنها را بصورتی که تجویز شده و در اسرع وقت مصرف کنید.



Anyone shown in these photos is a model.
The photos are used for illustrative purposes only.



شنیدن آن آسان نبود ولی از اینکه

بلافاصله درمان شدم، خوشحالم.

درباره سوزاک بیشتر بدانید:

■ با شماره رایگان زیر تماس بگیرید

1-800-232-4636

■ یا به وبسایت زیر مراجعه کنید:

www.ashastd.org

روش مصرف قرص ها:

در صورتی که با فرد مبتلا به سوزاک، رابطه جنسی از راه دهان داشته اید، احتمال دارد این دارو خوب اثر نکند. باید به پزشک مراجعه کنید تا داروی قوی تر بگیرید.

(Cefixime) سفکسیم ۸۰۰ میلی گرم: به محض دریافت دارو، تمام دارو را یکجا با آب بخورید.

چه مدت طول می کشد تا عفونت از بین برود؟

دارو را با کسی سهیم نشوید یا قرص ها را به شخص دیگری ندهید.

هفت روز طول می کشد. هفته بعد از مصرف دارو:

اغلب افراد پس از مصرف دارو، عوارض جانبی شدید ندارند.

بهبتر است به هیچ وجه رابطه جنسی از راه واژن، آلت تناسلی مردانه، دهان یا مقعد نداشته باشید.

بعضی افراد ممکن است احساس سرگیجه کنند یا معده شان ناراحت شود/ یا دچار اسهال شوند.

در صورتی که رابطه جنسی دارید، باید از کاندوم استفاده کنید، در غیر اینصورت دوباره به سوزاک مبتلا می شوید.

در موارد زیر بلافاصله به یک پزشک، درمانگاه یا اورژانس مراجعه کنید:

اینها مشکلات متداولی است که به خودی خود، ظرف چند روز رفع می شوند. اگر رفع نشدند، با پزشک خود صحبت کنید. همچنین اگر خارش یا ترشح از واژن داشتید، با پزشک خود تماس بگیرید

قرص ها برای اغلب افراد بسیار بی خطر هستند.

در موارد زیر، قبل از مصرف دارو با پزشک خود صحبت کنید اگر:

- استفراغ می کنید (بالا می آورید).
- در قسمت زیر شکم احساس درد می کنید یا در هنگام نزدیکی درد دارید.
- سینه تان حس حس می کند/ نفس کشیدن برایتان سخت است.
- کهپیر زدید یا تب دارید.
- در بیضه ها (تخم ها) تورم یا درد دارید.
- در مفاصلتان درد شدید دارید.

قبلا واکنش بد، کهپیر یا حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک داشته اید.

- دچار بیماری جدی مانند بیماری های کلیه، قلب یا کبد هستید.
- در حال حاضر دارویی دیگر را که برایتان تجویز شده، مصرف می کنید.
- باردار هستید یا امکان دارد باردار باشید.
- بچه شیر می دهید.

این علائم می تواند نشانه آن باشد که شما به دارویی قوی تر نیاز دارید یا نسبت به آنتی بیوتیکی که مصرف می کنید، حساسیت دارید.

در این موارد، اهمیت دارد که بلافاصله درباره اینکه چه باید بکنید، با پزشک خود صحبت کنید.

درمانگاهی در نزدیک منزلتان پیدا کنید.

همین حالا از نظر سوزاک آزمایش شوید.

- از همخوابه تان بپرسید کجا آزمایش داده است یا با شماره تلفن فوریت های 800-CDC-INFO، CDC یا ۸۰۰-۲۳۲-۴۶۳۶ تماس بگیرید.
- از نظر دیگر بیماری های مقاربتی که شامل سفلیس و HIV می شود، آزمایش شوید.
- با مصرف (pre-exposure prophylaxis) PrEP که قرصی روزانه است که به شما کمک از نظر HIV منفی بمانید، از خودتان حفاظت کنید.

- آزمایش دردناک نیست، شما فقط باید در یک لیوان ادرار کنید. همچنین یک آزمایش با سواب هم هست که خودتان می توانید استفاده کنید.
- هر فردی که طی ۶۰ روز قبل هم با شما رابطه جنسی داشته است، باید آزمایش شود.
- در صورتی که نتیجه آزمایش مثبت بود، سه ماه بعد آزمایش دیگری انجام دهید که اطمینان حاصل کنید دوباره سوزاک نگرفته اید