



이런 소식을 접하는 것이  
쉽지는 않았지만 즉시 치료를  
받게 되어 기쁩니다.

임질에 대한 추가 정보는:

수신자 부담 전화 1-800-232-  
4636으로 전화하시거나

[www.ashstd.org](http://www.ashstd.org)를  
방문하십시오.



## 임질 지금 당신이 해야 할 일

당신의 성관계 파트너는 임질에 걸렸습니다 (gonorrhea: 고너리아). 이러한 성병은 성관계를 통해 감염될 수 있으며 치유가 가능합니다. 당신 또한 임질에 걸렸을 수 있습니다.

당신의 파트너가 임질을 치료하기 위해 약을 복용해 왔습니다. 당신 또한 성매개 감염병(STI)에 관련하여 의사의 진찰 및 검사를 받아야 하며 가능한 한 빨리 임질 치료제를 복용해야 합니다.

### 당신이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 임질은 쉽게 치료할 수 있습니다. 그러나 당신과 당신의 파트너 모두 가능한 한 빨리 의사의 지시사항에 따라 약을 복용해야 합니다.
- 음경, 질 또는 항문을 통한 성교를 함으로써 임질에 걸릴 수 있습니다. 구강 성교(음경, 질 또는 항문에 구강성교)를 통해서도 감염될 수 있습니다.
- 임질에 걸린 수많은 사람들이 본인의 감염 사실을 모르고 있습니다.
- 일부 사람들은 배뇨(소변배출) 시 작열감; 질, 음경 또는 항문에서의 분비물; 항문 출혈 또는 골반 통증을 동반하기도 합니다.
- 치료를 받지 않으면 중병에 걸리거나 불임이 될 가능성이 있습니다.
- 임질을 치료하지 않은 상태로 임신하게 될 경우 태아에게 해를 끼칠 수도 있습니다.

### 치료받기

당신의 파트너가 치료제나 치료제를 처방받을 수 있는 처방전을 가져다줄지도 모릅니다. 둘 중 어떤 경우에도 가능한 한 빨리 지시사항을 따라 약을 복용하는 것이 중요합니다.



이 사진에 나오는 사람은 모두 모델입니다.  
사진은 설명

## 약을 복용하는 방법은 다음과 같습니다

**세픽심(Cefixime; 800mg):** 전체 복용량을 물과 함께 즉시 복용하십시오.

- 이 약을 다른 사람과 나누어먹거나 양도하지 마십시오.

이 약을 복용한 대부분의 사람들은 복용 후 심각한 부작용을 겪지 않습니다.

- 일부 복용자들은 현기증을 느끼거나 배탈/ 설사를 경험할 수 있습니다.

이런 증세는 한 이틀 안에 저절로 사라질 일반적인 증상입니다. 만약 그렇지 않을 경우 의사와 상담하십시오. 질에서 가려움증이 유발되거나 분비물이 배출되는 경우에도 의사와 상담하십시오.

## 알약은 대부분의 사람들에게 매우 안전합니다.

다음과 같은 경우에는 약을 복용하기 전에 의사와 상담하십시오:

- 항생제에 대한 부작용, 발진 또는 알레르기를 경험한 적이 있습니다.
- 신장, 심장 또는 간 질환과 같은 심각한 질병을 가지고 있습니다.
- 현재 다른 처방약을 복용하고 있습니다.
- 임신 중이거나 임신 중일 가능성이 있습니다.

## 지금 당장 임질 검사를 받으십시오

- 검사는 통증을 유발하지 않습니다. 컵에 소변(오줌)만 채취하면 됩니다. 스스로 채취가 가능한 면봉 검사도 있습니다.
- 지난 60일 동안 당신과 성관계를 가진 적 있는 사람도 검사를 받아야 합니다.
- 양성인 경우 3개월 후에 임질 재감염 여부를 확인하기 위해 또 한 번 검사를 받으십시오.

- 모유 수유 중입니다.

이러한 경우에 대처 방법에 대해 의사와 즉시 상담하는 것이 중요합니다.

이미 임질에 감염된 사람에게 구강성교를 실시한 경우 약의 효력이 떨어질 수 있습니다. 더 강력한 약을 처방받으려면 의사에게 진찰을 받아야 합니다.

## 감염이 사라지기까지 얼마나 걸립니까?

7일이 소요됩니다. 치료제 복용 후 일주일 동안:

- 질, 음경, 구강, 항문 성교를 전적으로 피하는 것이 가장 좋습니다.
- 성관계를 갖게 된다면 반드시 콘돔을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 다시 임질에 걸릴 수 있습니다.

## 다음과 같은 경우에는 즉시 의사를 방문하십시오. 진료소 또는 응급실로 가십시오

- 구토 증세가 있는 경우 (토하는 경우).
- 아랫배 통증이나 성관계 시 통증이 있는 경우.
- 싹싹거리는 소리가 나거나 호흡 곤란이 있는 경우.
- 발진이나 발열이 있는 경우.
- 고환(불알)에 통증 또는 부기가 있는 경우.
- 관절에 심한 통증이 있는 경우.

위와 같은 경우 더 강력한 약이 필요하거나 항생제에 알레르기 반응이 있음을 의미할 수 있습니다.

## 가까운 진료소 찾기

- 당신의 파트너에게 어디에서 검사를 받았는지 물어보거나 질병관리센터(CDC) 상담전화 800-CDC-INFO 또는 800-232-4636으로 전화하십시오.
- 매독 및 HIV를 포함한 다른 성병에 대한 검사를 받으십시오.
- HIV 음성 상태를 유지하는 데 도움이 되는 일일 알약 프렙(PrEP: 노출 전 예방)을 복용하여 HIV로부터 스스로를 보호하십시오. 목적으로만 사용됩니다.